## AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 11-6-71 187088

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE: 24 your free par apx

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ · 21, route de Seurre · 21 BEAUNE · Tél. 5.17 et 9.57

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DUON 3405.12 K

25 Frs

Bulletin 129

<u>VIGNE</u>

10 Juin 1971

MILDIOU: Le mildiou ne s'est pas montré virulent jusqu'à ce jour. Les orages survenus les 5 et 6 juin sur l'ensemble de la Circonscription, en particulier ; Beaujclais, Mâconnais et Jura, imposent cerendant le renouvellement du traitement dans toutes les régions avant le 18 juin (en se rapprochant le plus possible de cette date).

N.B.: En cas d'orage violent survenant de suite après le traitement, renouveler dès que possi-

ble l'application.

OIDIUM : ajouter un anti-oïdium.

TAVELURES DU POINIER ET DU POIRIER : Les contaminations étant encore possible à partir des projections, il convient de renouveler les traitements pour tous les vergers.

CARPOCAPSE DES POINTES EXT DES POIRES: Les premières pénétrations se sont produites au début du mois ; la protection est assurée par le traitement conseillé dans notre dernière note.

OIDIUM DU POMMIER: La maladie est toujours très active; ajouter un fongicide anti-oldium à la bouillie anti-tavelure.

ARBUSTES A PUTITS FRUITS

OIDIUM AMERICATH SUR CASSISSIER : Renouveler le traitement conseillé dans notre bulletin du 19 mai. le parasite étant particulièrement à craindre vevec les conditions climatiques de cette année.

POME DE TERRE

MILDIOU: Un premier traitement est conseillé sur les cultures qui ne seront pas arrachées dans les prochains jours dans les régions de primeurs où la maladie est fréquente habituellement (zone d'Auxonne en particulier).

DORYPHORE: Nous rappelons notre note du 14 mai 1971.

HOUELONS

Le développement des pousses secondaires impose le renouvellement du traitement destiné à lutter contre le mildiou.

Si aucun produit n'a encore été ajouté à la bouillie anti-mildiou pour lutter contre les pucerons, ajouter un produit aphicide lors de ce prochain traitement.

## BETTERAVES

La deuxième génération de mouche de la betterave est en cours. Le développement végétatif des betteraves paraît suffisant pour ne pas justifier un traitement. Cependant ce traitoment pourrait être utile sur les betteraves les plus tardives ou les dégâts peurraient être plus importants.

Surveiller attentivement le dévelopmement des colonies de pucerons sur les feuilles du coeur des betteraves et intervenir si nécessaire avec un produit efficace à la fois contre pucerons et mouche.

Dermière note : Supplément nº 3 au Bulletin 128

Les Ingénieurs responsables des Avertissements Agricoles,

J. PETICT - M. TISSOT

L'Ingénieur d'Agronomie Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P346

Franche-Comté ". Le Directeur-Gérant : L. imprimerie de la Station

. . .

.